

# PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA

**Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG prowadzi prospektywne badanie kliniczne fazy 2 oceniające terapię wenetoklaksem i rytuksymabem u wcześniej nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.**

**Do badania mogą zostać zakwalifikowani chorzy, u których m.in.**

- Zdiagnozowano przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) lub chłoniaka z małych limfocytów (SLL)
- Nie stosowano wcześniej terapii CLL lub SLL, w tym: chemioterapii, terapii inhibitorami BTK, terapii wenetoklaksem, terapii drobnocząsteczkowym inhibitorem sygnalizacji, terapii przeciwciałem monoklonalnym.
- Istnieją wskazania kliniczne do rozpoczęcia leczenia CLL/SLL
- Występują odpowiednie wartości parametrów laboratoryjnych

Pacjenci w badaniu mogą otrzymać bezpłatnie leczenie wenetoklaksem skojarzonym z rytuksymabem, które nie jest dostępne w ramach standardowej opieki zdrowotnej w Polsce.

**Badanie prowadzone jest przez lekarzy hematologów w następujących lokalizacjach:**

- **Warszawa**
- **Poznań**
- **Gliwice**
- **Toruń**
- **Kielce**
- **Wrocław**
- **Gdańsk**

**Wszystkie szczegółowe informacje uzyskają Państwo po wysłaniu wiadomości pod adres email: [palg@io.gliwice.pl](mailto:palg@io.gliwice.pl)**